

## **ISTRUZIONI UTILIZZO PROTESI FISSA**

**Anche se la ricerca ha consentito di sviluppare materiali dentali di grande efficacia e sicurezza per la fabbricazione di protesi dentarie tali manufatti protesici non sono i ritrovati alternativi ai denti naturali, ma solo la soluzione sostitutiva in caso di loro mancanza. Pertanto la protesi applicate provvedono a restaurare il suo organo della masticazione senza tuttavia riportarlo alla funzione di un organo interno. Al fine di consentirle un uso sicuro e adeguato della sua protesi è opportuno che consideri attentamente le seguenti informazioni:**

- 1 - La protesi va adeguatamente mantenuta e controllata periodicamente monitorandola ogni 6 mesi.
- 2 - L'igiene domiciliare va mantenuta scrupolosamente per poter consentire una buona durata della protesi ed un corretto stato di salute dell'apparato masticatorio.
- 3 - La protesi è stata costruita per una funzione masticatoria sostitutiva, non è adatta per carichi eccessivi o traumi violenti (schiacciare noci o torrone duro, aprire tappi, spezzare oggetti).
- 4 - Nel caso si riscontrasse qualsiasi anomalia nella funzione masticatoria della protesi è necessario che si rechi per le dovute verifiche.
- 5 - La protesi potrebbe necessitare di correzioni e controlli non appena applicata, per questo è corretto prevedere di potersi recare presso lo studio nei giorni successivi.
- 6 - Ogni protesi, nei giorni successivi all'applicazione, può dare sensazioni o impressioni nuove. Siamo a disposizione per spiegazioni o suggerimenti utili ad un corretto e confortevole utilizzo.
- 7 - Nel caso la protesi acquistasse strane colorazioni o desse strani sapori in bocca è pregato di comunicarlo al primo controllo o telefonando.
- 8 - Se è stata cementata definitivamente una protesi fissa è meglio evitare per alcune ore (2-4) di masticare per permettere al cemento un indurimento completo.
- 9 - Se è stata cementata provvisoriamente una protesi fissa è meglio evitare per alcune ore (2- 4) di masticare. Ogni mese è necessario un controllo della cementazione provvisoria.

10 – Nel caso di fastidi quali: sensazione di mobilità della protesi, cattivi odori o sapori, dolore ai cibi o ai liquidi caldi e/o freddi, evitare di masticare e contattare lo studio.

11 – Nel caso di problemi nella chiusura dei denti fra loro (la protesi tocca prima degli altri denti; fastidi durante la masticazione o altro) contattare lo studio.

## **ISTRUZIONI UTILIZZO PROTESI FISSA**

**La protesi fissa applicata è provvisoria, e come tale destinata a rimanere nel cavo orale per il tempo che le è stato comunicato; non può rimanere in sicurezza più a lungo.**

1 - La protesi fissa provvisoria è adattata ad una funzione masticatoria normale e cauta, non è adatta per carichi eccessivi o traumi violenti.

2 - La cementazione utilizzata è volutamente morbida per permettere una rimozione comoda durante le cure. Evitare di masticare cibi troppo appiccicosi, gomme da masticare, caramelle gommosi, ecc.

3 - Verificare giornalmente, e senza forza, che i provvisori siano inseriti muovendoli dolcemente con le dita ben pulite.

4 - Nel caso il provvisorio fuoriuscisse, contatti lo studio per effettuare la cementazione, comunicando quando e come è accaduta la decementazione.

5 - Nel caso non si avesse la possibilità di ricementare a breve, non tenere il provvisorio in bocca durante la masticazione e la notte, per evitare il rischio di ingoiarlo. Conservare il provvisorio per procedere alla ricementazione il più presto possibile.